

MariDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

42,4 mg/170 mg/5,3 mg v 1 ml dermalna raztopina
salicilna kislina/mlečna kislina/jod

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 12 tednih, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

- 1.Kaj je zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom in za kaj ga uporabljamo
- 2.Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
- 3.Kako uporabljati zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom vsebuje salicilno kislino, mlečno kislino in jod v kolodiju. Salicilna in mlečna kislina razrahljata stike med odmrliimi celicami rožene plasti kože, s čimer zmehčata tkivo bradavice, ki se postopoma odlušči. Jod deluje protivirusno, protibakterijsko in protiglivično.

MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom uporabljamo za odstranjevanje kožnih bradavic.

To zdravilo je primerno za odrasle in otroke, stare več kot 5 let.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

Ne uporabljajte zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom:

- če ste alergični na (preobčutljivi za) salicilno kislino, mlečno kislino, jod ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- pri spremembah, vzbrsteh in izrastkih na koži in sluznicah, ki so neznanega izvora,
- na pigmentnih madežih,
- v okolici genitalij in rektuma, na obrazu ter drugih občutljivih predelih in v primeru izraščanja dlak iz bradavic,
- če je koža pordela, razdražena ali v primeru okužb kože in na nezaceljenih ranah,
- pri otrocih, mlajših od 5 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

- Če ne poznate izvora nastanka spremembe na koži, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Če se pojavi pekoče zbadanje ali močno vnetje na mestu uporabe kljub uporabi tega zdravila v skladu z navodili, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Posebna previdnost je potrebna v primeru, če imate sladkorno bolezen (diabetes), slabo prekrvavitev ali okvaro živcev okončin (rok in nog).
- Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je

- namenjeno samo za zunanjo uporabo! Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami ter vneto in poškodovano kožo. Če se to zgodi, izpirajte prizadete predele z veliko količino vode. Če je prišlo zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom v oko ali ste ga zaužili, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Dolgotrajno uporabo zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom na večjih površinah kože odsvetujemo.
 - Posebna previdnost je potrebna pri uporabi zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom, če ste nagnjeni k preobčutljivostnim reakcijam (seneni nahod, astma).
 - Pazite, da vsebine zdravila ne razlijete, saj lahko poškoduje kožo in druge predmete. Če pride vsebina zdravila v stik z oblačili, tkanino, nakitom ali kovinskimi oziroma loščenimi predmeti, jih lahko trajno poškoduje.
 - Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je hlapljivo in vnetljivo. Ne uporabljajte ga v neposredni bližini odprtega ognja ali drugih virov vžiga (na primer prižgana cigareta). Izogibajte se vdihavanju hlapov zdravila.

Otroci in mladostniki

Uporaba tega zdravila ni primerna za otroke, mlajše od 5 let. Tega zdravila ne uporabljajte pri otrocih ali mladostnikih med virusno okužbo ali takoj po njej (na primer gripa, norice).

Druga zdravila in zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom

Ni poročil o medsebojnem delovanju zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom z drugimi zdravili.

Na mestu uporabe tega zdravila ne uporabljajte sočasno drugih pripravkov za uporabo na koži, razen če zdravnik svetuje drugače.

Nosečnost in dojenje

Uporabo tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem odsvetujemo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje

Zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom s pomočjo čopiča v zamašku nanosite 1-krat dnevno zvečer pred spanjem na bradavico.

- Pred uporabo tega zdravila z mesta odstranite morebiten obliž in mesto z bradavicami namakajte v topli vodi 5 minut.
- Nato osušite mesto nanosa z uporabo brisače.

- Osušen vrh bradavic previdno podrgnite s pilico ali kamnom za odstranjevanje trde kože, grobo tkanino ali podobnim. Pri tem pazite, da ne poškodujete zdrave kože v okolici bradavic.
- Nanesite zadostno količino tega zdravila, da prekrije bradavice. Pazite, da zdravila ne nanesete na zdravo kožo v okolici bradavic. Okolico mesta uporabe lahko pred nanosom zaščitite z obližem ali masno negovalno kremo oziroma mazilom, da preprečite morebiten stik zdravila z zdravo kožo.
- Ko se naneseno zdravilo dobro posuši, bradavice, na katere ste nanesli zdravilo, prelepite z obližem.
- Po uporabi stekleničko dobro zaprite.

Če zdravnik ali farmacevt ne svetuje drugače, postopek ponavljajte do odstranitve bradavic, vendar ne več kot 12 tednov. Če v 12 tednih bradavic ne uspete odpraviti ali pride na mestu nanosa do vnetja, se posvetujte z zdravnikom.

Bradavice so nalezljive in se lahko okužijo tudi drugi. Zato vedno uporabljajte le svojo brisačo. Če imate bradavice na spodnjem delu stopala, ne hodite bosi. Bradavice se lahko prenesejo tudi z enega dela telesa na drugega.

Če ste pomotoma nanesli zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom na zdravo kožo, ga nemudoma obrišite z robčkom in po potrebi sperite.

Če ste vdihovali večje količine hlapov zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom, se lahko pojavi omotica. V tem primeru pojdite na sveži zrak.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom, ne uporabite dvojnega odmerka. Zdravilo uporabite, ko se spomnite in nadaljujte z zdravljenjem v skladu z navodili za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V redkih primerih se lahko pojavi alergija na (preobčutljivost za) sestavine zdravila. Kratek čas po uporabi se lahko pojavi rahel pekoč ali zbadajoč občutek na mestu uporabe. V okolici nanosa lahko pride do poškodbe zdrave kože, če je niste zaščitili in ste nanjo pomotoma nanesli to zdravilo.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli od neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

◦ Tel.: 08 2000 500

◦ Faks: 08 2000 510

◦ E-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

◦ Spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MARIDERM KOLODIJ ZA ODSTRANJEVANJE BRADAVIC Z JODOM

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C na suhem mestu. Shranjujte dobro zaprto v originalni ovojnini, zaščiteno pred svetlobo in ognjem.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in steklenički poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom

1 ml (0,85 g) dermalne raztopine vsebuje (zdravilne učinkovine):

- 42,4 mg salicilne kisline (*Acidum salicylicum*),
- 170 mg mlečne kisline (*Acidum lacticum*),
- 5,3 mg joda (*Iodum*).

Pomožne snovi so: elastični kolodij (piroksilin, eter, etanol in ricinusovo olje), etanol, eter, kalijev jodid, prečiščena voda.

Izgled zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom in vsebina pakiranja

MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je bistra, rdečerjava, lahko hlapljiva raztopina, izrazitega vonja po etru.

Pakiranje: škatla z 10 ml dermalne raztopine v temni steklenički z zaporko s čopičem.

Način in režim izdaje zdravila MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. MariDERM kolodij za odstranjevanje bradavic z jodom je galensko zdravilo.

Lekarne Maribor

Minařikova ulica 6

2000 Maribor



LEKARNE MARIBOR

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na proizvajalca: Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.

Telefon: 02 450 28 00

E-pošta: info@mb-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano:

maj 2024